СМЕРТНОСТЬ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ

БОРОВАЯ Т.В., ЗАХАРЕНКО А.Г.

*Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия
последипломного образования», г. Минск. Республика Беларусь*

Цель исследования. Изучить смертность от болезней системы кровообращения (далее – БСК) в Минской области Республики Беларусь у лиц трудоспособного возраста в зависимости от пола.

Материал и методы. По итогам реализации мероприятий, предусмотренных Программой демографической безопасности Минской области на 2011–2015 годы, проанализированы показатели смертности у лиц трудоспособного возраста мужского и женского пола в динамике за 5 лет (2012–2016 годы) от БСК.

Результаты. За анализируемый период достигнуто снижение смертности населения региона, в том числе в трудоспособном возрасте. Так, смертность от всех причин лиц трудоспособного возраста снизилась с 5,6 на 1000 населения трудоспособного возраста в 2012 году до 4,8 в 2016 году, т.е. на 14,3%. При БСК снижение смертности еще более выраженное – на 15,8% (с 1,9 до 1,6 на 1000 населения соответственно). В числе случаев это составляет: 1599 умерших от БСК в 2012 году против 1303 в 2016 году, или уменьшение случаев смерти на 18,5%. Однако, БСК по-прежнему занимают первое место в структуре смертности населения. В трудоспособном возрасте доля умерших от БСК составляет 34,4% случаев смерти от всех причин.

Сохраняются неблагоприятные тенденции в смертности лиц трудоспособного возраста в зависимости от пола со значительным преобладанием смертности мужского населения. Число умерших мужчин в трудоспособном возрасте в 4,5 раза выше, чем женщин. При БСК эти различия еще более выраженные. В 2016 году смертность от БСК у мужчин составила 2,7 случая на 1000 трудоспособных, у женщин – 0,4 случая соответственно, т.е. смертность у мужчин в 6,1 раза выше. В 2012 году показатель смертности у мужчин превышал аналогичный показатель у лиц женского пола в 5,6

раза. В абсолютных значениях доля лиц мужского пола, в 2016 году умерших по причине БСК, составила 88% (из 1303 случаев смерти от БСК мужчин умерло 1147, женщин – 156).

От ишемической болезни сердца (ИБС) смертность у мужчин в 2016 году составила 1,8 случаев, у женщин – 0,17 на 1000 трудоспособного населения, т.е. относительный показатель смертности от ИБС у мужчин в 10,5 раза выше, чем у женщин. В абсолютных значениях число всех умерших от ИБС в 2016 году составило 850 случаев, из них 787 умерших составляли лица мужского пола (92,6%).

По причине смерти от инфаркта миокарда в 2016 году умерло в трудоспособном возрасте 62 мужчины и 4 женщины, доля лиц мужского пола – 93,9%. По данным за 2012 год доля лиц мужского пола была ниже – 87%.

Аналогичная ситуация наблюдается и при острых нарушениях мозгового кровообращения (ОНМК). Среди умерших в 2016 году от ОНМК лица мужского пола составили 80%. Так, всего умерло в трудоспособном возрасте по причине ОНМК 202 человека, из них 162 – это лица мужского пола, т.е. число умерших мужчин больше в 4 раза, чем женщин.

Заключение. Таким образом, при положительной динамике в снижении смертности населения трудоспособного возраста, в том числе по причине БСК, отмечаются значительные, более высокие уровни смертности у мужчин. Данное обстоятельство требует совершенствования диспансеризации лиц мужского пола, повышения эффективности профилактической работы, организации мероприятий по контролю основных индикаторов Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность на 2016–2020 годы».