


Министерство здравоохранения РФ
Российский кардиологический
научно-производственный комплекс Министерства
здравоохранения РФ



ОРГКОМИТЕТ:
В г. Москве: Российский кардиологический
научно-производственный комплекс
Минздравсоцразвития

Адрес: 121552, Москва,
3-я Черепковская, 15а.
Телефоны для справок: (495) 414-62-70,
тел. факс: (495) 414-62-14, (499) 149-08-51

Вся информация на сайте:
WWW.CARDIOWEB.RU
E-MAIL: CONGRESS@CARDIOWEB.RU
Тезисы принимаются до 01.10.2012 г.

«Неотложная кардиология – 2012»

V Всероссийская конференция

**28 – 29 ноября 2012 года
г. Москва**

**ХРОНИКА, ИНФОРМАЦИЯ,
КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ**

**CURRENT EVENTS, INFORMATION,
SCHEDULE OF SCIENTIFIC ACTIVITIES**

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ


№№ п/п	Название	Место проведения	Дата	Ссылка на сайт
June				
4.	The first Cardiovascular Complication Conference 2012 (CCC 2012)	Frankfurt, Germany	June 8 – 9, 2012	http://www.ccc2012.eu/
5.	ADA 72nd Scientific Sessions	Philadelphia, PA	June 8 – 12, 2012	http://www.ash-us.org/
6.	AANP 27th National Conference	Orlando, FL	June 20 – 24, 2012	http://www.aanp.org/
July				
7.	International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP) Meeting	Geneva, Switzerland	July 9 – 12, 2012	http://www.isshp2012.com/
8.	17th WORLD CONGRESS ON HEART DISEASE Annual Scientific Sessions 2012	Toronto, ON, Canada	July 27 – 30, 2012	http://www.cardiologyonline.com/
August				
9.	ESC Congress 2012	Munich, Germany	August 25 – 29, 2012	http://www.escardio.org/
September				
10.	36th Meeting of the European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology	Nantes, France	September 15 – 16, 2012	http://www.escardio.org/
11.	2012 ESH Summer School	Dublin, Ireland	September 15 – 21, 2012	http://www.eshonline.org/
12.	24th Scientific Meeting of ISH	Sydney, Australia	September 29 – October 4, 2012	http://www.ish-world.com/
October				
13.	Acute Cardiac Care 2012	Istanbul, Turkey	October 20 – 22, 2012	http://www.escardio.org/
14.	ASN Kidney Week 2012	San Diego, CA	October 30 - November 4, 2012	http://www.ash-us.org/
15.	Российский национальный конгресс кардиологов	Москва	3 – 5 октября 2012 г.	www.scardio.ru
November				
16.	V Всероссийская конференция «Неотложная кардиология - 2012». Роль неотложной кардиологии в снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний	Москва	28 – 29 ноября 2012	http://cardioweb.ru/
December				
17.	EUROECHO	Athens, Greece	December 5 – 8, 2012	http://www.escardio.org/
	World Healthcare Congress of Clinical Lipidology	Budapest, Hungary	December 6 – 8, 2012	http://www.clinical-lipidology.com/



Boehringer
Ingelheim

МИКАРДИС 80 мг
ТЕЛМИСАРТАН 80 мг

МИКАРДИСПЛЮС
ТЕЛМИСАРТАН 80 мг + ГИДРОХЛОРОТИАЗИД 12,5 мг



Власть над давлением

МИКАРДИС® – первый и единственный доступный для клинической практики БРА с двумя механизмами действия*

Информация по медицинскому применению препарата Микардис®.
Торговое название: Микардис® (Mikardis®).
Регистрационный номер: П N015387/01 от 15.12.2009 г.
Международное непатентованное название: Телмисартан (Telmisartan).
Лекарственная форма: таблетки. Состав: в одной таблетке содержится 40 мг или 80 мг телмисартана. Показания к применению: артериальная гипертензия; снижение сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности у пациентов в возрасте 55 лет и старше с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Противопоказания: повышенная чувствительность к активному веществу или к любому другому компоненту препарата, непереносимость фруктозы, беременность, период кормления грудью, обструктивные заболевания желчевыводящих путей, выраженные нарушения функции печени, возраст пациента до 18 лет. Взаимодействие: Микардис® может усиливать гипотензивный эффект других антигипертензивных препаратов. Другие

клинически значимые взаимодействия не установлены. Дозировка и назначение: Взрослые: рекомендуемая начальная доза Микардиса — 40 мг один раз в день. В случаях, когда оптимальное снижение артериального давления не достигается, дозу Микардиса можно увеличить до 80 мг в день. Пожилые: коррекция доз не требуется. Снижение сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности: рекомендуемая доза — 1 таблетка препарата Микардис® 80 мг 1 раз в сутки. В начальный период лечения может потребоваться дополнительная коррекция АД. Побочное действие: головокружение, бессонница, тревожность, депрессия, судороги, инфекции верхних дыхательных путей, выраженное снижение артериального давления, брадикардия, тахикардия, боль в груди, диспепсия, абдоминальные боли, повышение активности «печеночных» трансаминаз, миалгия, артралгия, симптомы, подобные тендиниту, инфекции мочевыводящей системы, сепсис, боль в спине и др. Форма выпуска: таблетки по 40 и 80 мг. Условия хранения: хранить при температуре не выше 30 °С в защищенном от влаги

месте. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности: 4 года. Условия отпуска из аптек: по рецепту врача. МикардисПлюс® (MikardisPlus®). Рег. номер: П N015915/01 от 22.07.2009 г. (телмисартан + гидрохлоротиазид). * Микардис 40 мг, Микардис 80 мг, МикардисПлюс являются зарегистрированными торговыми марками ООО «Берингер Ингельхайм». Перед назначением любого упомянутого препарата, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по его применению.

ООО «Берингер Ингельхайм»,
125171, РФ, Москва, Ленинградское шоссе, 16 А, стр. 3.
Тел. +7 (495) 544-50-44

* Чазова И.Е., Ратова Л.Г. Системные гипертензии 2010; 4:5-9.