*Яровой С.Ю., Данилов Н.М., Матчин Ю.Г., Чазова И.Е.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ ПОСЛЕ ТРАНСЛЮМИНАЛЬНОЙ БАЛЛОННОЙ АНГИОПЛАСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 121552, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г. МОСКВА, УЛИЦА 3-Я ЧЕРЕПКОВСКАЯ, 15А

Сведения об авторах:

***Автор, ответственный за связь с редакцией:** Яровой Сергей Юрьевич – младший научный сотрудник отдела гипертонии Института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный Медицинский Исследовательский Центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, e-mail: doctoryarovoy@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1982-3061>, адрес: 121552, г. Москва, улица 3-я Черепковская, 15А

Данилов Николай Михайлович – доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела гипертонии Института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный Медицинский Исследовательский Центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, e-mail: ndanilov1@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-9853-9087>

Матчин Юрий Георгиевич – доктор медицинских наук, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения №2 Института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный Медицинский Исследовательский Центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 8-495-414-68-53, e-mail: yumatchin@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-0200-852X>

Чазова Ирина Евгеньевна – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по научно-экспертной работе, руководитель отдела гипертонии Института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный Медицинский Исследовательский Центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 8-495-414-61-33, e-mail: c34h@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9822-4357>

АННОТАЦИЯ

Цель. Оценить влияние транслюминальной ангиопластики легочных артерий (ТЛА) на структурные изменения легочных артерий у неоперабельных пациентов с хронической тромбоэмболической легочной гипертензией (ХТЭЛГ).

Материалы и методы. В исследование был включен 21 пациент с неоперабельной формой ХТЭЛГ. Проводилось определение клинических, гемодинамических параметров, измерение диаметра легочных артерий с помощью ангиографии, 11 пациентам – дополнительно измерение структурных показателей легочных артерий с помощью внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ), исходно, сразу после ТЛА и после серии ТЛА.

Результаты. Всего было выполнено 50 процедур ТЛА – серии из 2,3±1,5 этапов ТЛА на одного пациента. Продолжительность наблюдения – 165 (88;248) дней. После серии ТЛА отмечалась положительная динамика клинических и гемодинамических параметров, в том числе функционального класса, дистанции в тесте 6-минутной ходьбы, среднего давления в легочной артерии (срДЛА), легочного сосудистого сопротивления (ЛСС). По данным ангиографии продолжения дилатации артерий после первой ТЛА наблюдалось на уровне сег-

ментарных артерий и ветвей 1-го порядка субсегментарных артерий. При ВСУЗИ наибольшие изменения определялись в ветвях 1-го и 2-го порядка субсегментарных легочных артерий – увеличение наружного и внутреннего диаметра, площади просвета сосуда, уменьшение площади сосудистой стенки. Была выявлена статистическая связь между диаметром ветвей 1-го порядка субсегментарных артерий после ТЛА и срДЛА ($r=-0,74$, $p=0,006$), сердечным выбросом ($r=0,71$, $p=0,010$), ЛСС ($r=-0,78$, $p=0,003$).

Заключение. ТЛА у неоперабельных пациентов с ХТЭЛГ приводит к стойкому увеличению просвета баллонированных сосудов. В отдаленном периоде происходит положительное ремоделирование легочных артерий с наибольшим эффектом дистальнее уровня субсегментарных артерий. Диаметр сосудов на этом уровне имеет выраженную корреляционную связь с гемодинамическим результатом ТЛА.

Ключевые слова: хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия, транслюминальная баллонная ангиопластика легочных артерий, внутрисосудистое ультразвуковое исследование, положительное ремоделирование.

Отношения и деятельность: нет.

Конфликт интересов: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Вклад авторов в работу: все авторы соответствуют критериям авторства ICMJE, принимали участие в подготовке статьи, наборе материала и его обработке.

Информация и соблюдение этических норм при проведении исследования: Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования был одобрен Этическим комитетом клинического центра. До включения в исследование у всех участников было получено письменное информированное согласие.

✉ DOCTORYAROVY@GMAIL.COM

Для цитирования: Яровой С.Ю., Данилов Н.М., Матчин Ю.Г., Чазова И.Е. Структурные изменения легочных артерий после транслюминальной баллонной ангиопластики у пациентов с хронической тромбоэмболической легочной гипертензией. Евразийский кардиологический журнал. 2020;(4):12-20, <https://doi.org/10.38109/2225-1685-2020-4-12-20>

Рукопись получена: 05.10.2020 | Рецензия получена: 12.10.2020 | Принята к публикации: 02.11.2020

© Яровой С.Ю., Данилов Н.М., Матчин Ю.Г., Чазова И.Е.

*Sergey Y. Yarovoy, Nikolay M. Danilov, Yuri G. Matchin, Irina E. Chazova

STRUCTURAL CHANGES OF THE PULMONARY ARTERIES AFTER BALLOON PULMONARY ANGIOPLASTY IN PATIENTS WITH CHRONIC THROMBOEMBOLIC PULMONARY HYPERTENSION

FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION NATIONAL MEDICAL RESEARCH CENTER OF CARDIOLOGY OF THE MINISTRY OF HEALTHCARE OF THE RUSSIAN FEDERATION, 3D CHEREPKOVSKAYA ST., 15A, MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION, 121552

Information about authors:

***Author, responsible for communication with the editors: Sergey Y. Yarovoy** – MD, junior researcher of Hypertension Department of Institute of Clinical Cardiology named after A.L. Myasnikov, Federal State Budgetary Institution National Medical Research Center of Cardiology of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, doctoryarovoy@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1982-3061>, address: 3d Cherepkovskaya st., 15A, Moscow, Russian Federation, 121552

Nikolay M. Danilov – Dr. of Sci. (Med.), leading researcher of Hypertension department of Institute of Clinical Cardiology named after A.L. Myasnikov, Federal State Budgetary Institution National Medical Research Center of Cardiology of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, ndanilov1@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-9853-9087>

Yuri G. Matchin – Dr. of Sci. (Med.), head of the Endovascular diagnosis and treatment department №2 of Institute of Clinical Cardiology named after A.L. Myasnikov, Federal State Budgetary Institution National Medical Research Center of Cardiology of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, yumatchin@gmail.com, 8-495-414-68-53, <https://orcid.org/0000-0002-0200-852X>

Irina E. Chazova – Academician of the Russian Academy of Science, Dr. of Sci. (Med.), Professor, Deputy Director General for research and expert work, head of Hypertension department of Institute of Clinical Cardiology named after A.L. Myasnikov, Federal State Budgetary Institution National Medical Research Center of Cardiology of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, c34h@yandex.ru, 8-495-414-61-33, <https://orcid.org/0000-0002-9822-4357>

ABSTRACT

Aim. To assess the effect of balloon pulmonary angioplasty (BPA) on structural parameters of the pulmonary arteries in inoperable patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH).

Materials and methods. The study included 21 patients with an inoperable form of CTEPH. Assessment of clinical and hemodynamic parameters, pulmonary arteries diameters according to angiography, and structural parameters of the pulmonary arteries according to intravascular ultrasound (IVUS) in 11 patients was performed initially, immediately after BPA and after a series of BPA.

Results. In total 50 BPA were performed – series of 2.3 ± 1.5 BPA per patient. The observation was carried out for 165 (88; 248) days. After series of BPA there were found out positive changes of clinical and hemodynamic parameters, including functional class, distance in the 6-minute walk test, mean pulmonary artery pressure (mPAP), pulmonary vascular resistance (PVR). According to angiography there was observed a continued dilation of the arteries at the level of segmental arteries and the 1st order branches

of subsegmental arteries after the first BPA. According IVUS measurements the greatest changes during the observation period were determined at the 1st and 2d order branches of subsegmental pulmonary arteries – increased outer and inner diameters, vessel lumen area, decreased vascular wall area. A statistical relationship was found out between the diameter of the 1st order branches of subsegmental arteries after BPA and mPAP ($r = -0.74$, $p = 0.006$), cardiac output ($r = 0.71$, $p = 0.010$), PVR ($r = -0.78$, $p = 0.003$).

Conclusion. BPA in inoperable patients with CTEPH leads to a persistent enlargement of the ballooned vessel lumen. In the long term, there is a positive remodeling of the pulmonary arteries with the greatest effect at the level more distal than subsegmental arteries. The diameter of the vessels at this level has a strong correlation with the hemodynamic result of BPA.

Key words: chronic thromboembolic pulmonary hypertension, balloon pulmonary angioplasty, intravascular ultrasound, positive remodeling

Relations and activities: no.

Conflict of Interest: All authors declare that there is no potential conflict of interest requiring disclosure in this article.

Contribution of the authors: All authors meet the ICMJE criteria for authorship, participated in the preparation of the article, the collection of material and its processing.

Information and Ethical Compliance in Research: The study was carried out in accordance with Good Clinical Practice and the principles of the Declaration of Helsinki. The study protocol was approved by the Ethics Committee of the clinical center. Written informed consent was obtained from all participants prior to enrollment.

✉ DOCTORYAROVY@GMAIL.COM

For quotation: Sergey Y. Yarovoy, Nikolay M. Danilov, Yuri G. Matchin, Irina E. Chazova. Structural changes of the pulmonary arteries after balloon pulmonary angioplasty in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Eurasian heart journal. 2020;(4):12-20 (In Russ.)). <https://doi.org/10.38109/2225-1685-2020-4-12-20>

Received: 05.10.2020 | **Revision Received:** 12.10.2020 | **Accepted:** 02.11.2020

© Sergey Y. Yarovoy, Nikolay M. Danilov, Yuri G. Matchin, Irina E. Chazova

ВВЕДЕНИЕ

Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия (ХТЭЛГ) – прекапиллярная форма легочной гипертензии (ЛГ), обычно формирующаяся как осложнение перенесенной массивной тромбоэмболии легочной артерии. Два звена патогенеза – обструкция крупных и средних сосудов организованными тромбами и вторичные изменения микроциркуляторного русла – приводят к повышению легочного сосудистого сопротивления (ЛСС) и давления в легочной артерии (ДЛА). При естественном течении заболевания исходом ХТЭЛГ, как и других групп ЛГ, является дисфункция правых отделов сердца, сердечная недостаточность и смерть [1-4].

Одним из методов лечения ХТЭЛГ является транслюминальная баллонная ангиопластика легочных артерий (ТЛА) [1-3]. В современных рекомендациях ТЛА имеет класс IIb, уровень доказательности C и может рассматриваться при неблагоприятном соотношении риск/польза от операции тромбэндартэктомии и у неоперабельных пациентов [2]. Поскольку, несмотря на совершенствование хирургической техники, до 37% пациентов с ХТЭЛГ признаются неоперабельными (чаще всего вследствие дистального типа поражения легочных артерий или тяжелой сопутствующей патологии) [5,6], данный метод получает все большее распространение. В настоящее время также рассматривается применение ТЛА в сочетании с другими вариантами лечения ХТЭЛГ – с ЛАГ-специфической терапией и в комбинации с оперативным лечением [7,8].

В работах отечественных авторов ранее было показано, что в отдаленном периоде после ТЛА у пациентов продолжается постепенная дилатация прооперированных артерий, и указанные изменения имеют высокую силу корреляции с дистанцией в тесте 6-минутной ходьбы (Т6МХ). К сожалению, данные о механизме обратного ремоделирования, то есть структурного изменения легочных артерий, после ТЛА ограничены небольшим

объемом наблюдений и отсутствием данных об особенностях строения стенки таких артерий.

Цель настоящего исследования – оценить влияние ТЛА на структурные изменения легочных артерий у неоперабельных пациентов с ХТЭЛГ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа выполнена на базе отдела гипертонии и лаборатории рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения в амбулаторных условиях при научно-диспансерном отделе Института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ. Исследование выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинской декларации по правам человека, протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ. Всеми пациентами до включения в исследование были подписаны информированные согласия на участие в исследовании и обработку персональных данных.

В проспективное исследование был включен 21 пациент с неоперабельной ХТЭЛГ. Диагноз был верифицирован по результатам предварительного обследования в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ в соответствии с действующими клиническими рекомендациями. Состояние каждого пациента обсуждалось мультидисциплинарной комиссией в составе кардиолога, рентгенэндоваскулярного и сердечно-сосудистого хирурга, после чего принималось решение о возможности выполнения операции ТЭА.

Критерии включения в исследование:

- наличие хронических/ организованных тромбов/ эмболов в легочных артериях эластического типа по данным инвазивных/ неинвазивных визуализирующих методов исследования (ангиопульмонография, МСКТ ангиопульмонография, перфузионная сцинтиграфия легких);

Таблица 1. Исходные клинические, гемодинамические и структурные параметры
Table 1. Baseline clinical, hemodynamic and structural parameters

Пол мужчины / женщины	9 / 12
Возраст, лет	60,1±13,9
Давность ТЭЛА, годы	4,9±3,9
ФК: I : II : III : IV	2,9±0,7 1(4,8%) : 5 (23,8%) : 13 (61,9%) : 2 (9,5%)
Т6МХ, м	350 (230;426)
BNP, пг/мл	452,5 (156,0;565,2)
срДЛА, мм рт.ст.	48 (43;52)
СВ, л/мин	3,75 (3,0;4,8)
ЛСС, дин*сек/см ⁵	910 (675;1076)
Ддист, мм	2,2 (2,0; 2,4)
Дсред, мм	3,9 (2,9;5,0)
Дпрокс, мм	8,4 (6,0;9,2)

Примечание: ФК – функциональный класс по классификации Всемирной Организации Здравоохранения; Т6МХ – тест 6-минутной ходьбы; BNP – мозговой натрийуретический пептид; срДЛА – среднее давление в легочной артерии; СВ – сердечный выброс; ЛСС – легочное сосудистое сопротивление; Ддист – диаметр ветви легочной артерии в дистальном отделе по данным ангиопульмонографии; Дсред – диаметр ветви легочной артерии в среднем отделе по данным ангиопульмонографии; Дпрокс – диаметр ветви легочной артерии в проксимальном отделе по данным ангиопульмонографии.

Note: FC – functional class according to the classification of the World Health Organization; 6MWT – 6-minute walking test; BNP – brain natriuretic peptide; mPAP – mean pulmonary artery pressure; CO – cardiac output; PVR – pulmonary vascular resistance; Ddist – diameter of the branch of pulmonary artery in the distal section according to angiopulmonography; Dmid – diameter of the branch of pulmonary artery in the middle section according to angiopulmonography; Dprox – diameter of the branch of pulmonary artery in the proximal section according to angiopulmonography.

- среднее давление в легочной артерии (срДЛА) > 25 мм рт.ст., давление заклинивания в легочной артерии (ДЗЛА) ≤ 15 мм рт.ст., легочное сосудистое сопротивление (ЛСС) > 240 дин*сек/см⁵;
- неоперабельный статус пациента: дистальный тип поражения легочных артерий, ЛСС > 1100 дин*сек/см⁵, тяжелая дисфункция правого желудочка, тяжелые и средней степени тяжести заболевания легких, выраженная сопутствующая патология других органов и систем, кровотечение любой локализации или высокий риск кровотечения в послеоперационном периоде, невозможность проведения искусственного кровообращения с циркуляторным арестом.

Критерии исключения:

- пациенты с ЛГ любой другой этиологии, кроме ХТЭЛГ;
- хроническая болезнь почек IV и V стадии;
- жизнеугрожающие нарушения ритма;
- непереносимость/аллергия на рентгеноконтрастные препараты в анамнезе;
- острая тромбоэмболия легочной артерии;
- нарушение мозгового кровообращения давностью менее 1 месяца;
- острый воспалительный процесс любого происхождения;
- индивидуальная непереносимость илопроста;
- необходимость значительной коррекции поддерживающей диуретической терапии в течение последних 3 месяцев;
- отсутствие эффективной антикоагулянтной терапии на протяжении последних 3 месяцев;
- крайне тяжелое состояние пациента, не позволяющее провести оперативное вмешательство.

Характеристика пациентов

Из 21 включенного в исследование пациента 9 – мужчины, 12 – женщины. Возраст пациентов в среднем составил 60,1±13,9 года. Период времени, прошедший после перенесенной тромбоэмболии легочной артерии – 4,9±3,9 года. Среди пациентов, включенных в исследование, были представлены все 4 функциональных класса (ФК) согласно классификации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) – I : II : III : IV соответственно 1 пациент (4,8%) : 5 пациентов (23,8%) : 13 пациентов (61,9%) : 2 пациента (9,5%); среднее значение ФК 2,9±0,7. Пройденная дистанция в тесте 6-минутной ходьбы (Т6МХ) – 350 (230;426)

метров. Параметры гемодинамики по данным КПОС перед включением пациента в исследование: среднее давление в легочной артерии (срДЛА) – 48 (43;52) мм рт.ст., легочное сосудистое сопротивление (ЛСС) – 910 (675;1076) дин*сек/см⁵. Диаметр ветви легочной артерии, планируемой к ТЛА (условно в дистальном, среднем и проксимальном отделах) по данным ангиопульмонографии: Ддист 2,2 (2,0; 2,4), Дсред 3,9 (2,9;5,0), Дпрокс 8,4 (6,0;9,2). Более подробная характеристика пациентов представлена в таблице 1.

Причины неоперабельности пациентов: кровотечение любой локализации или высокий риск кровотечения в послеоперационном периоде – у 2 (9,5%) пациентов, сопутствующая выраженная патология других органов и систем – у 2 (9,5%) пациентов, ЛСС более 1100 дин*сек/см⁵ – у 5 (23,8%) пациентов, дистальный тип поражения легочных артерий – у 16 (76,1%) пациентов.

11 пациентам из 21 также проводилось внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ). В таблице 2 приведены некоторые характеристики сосудов на 3 уровнях измерения по данным ВСУЗИ.

Все пациенты в течение периода наблюдения получали адекватную антикоагулянтную и диуретическую терапию, при необходимости – другую симптоматическую терапию ХТЭЛГ. ЛАГ-специфические препараты в течение периода наблюдения не назначались.

МЕТОДЫ

Оценка клинических, гемодинамических параметров, структурных характеристик легочных артерий проводилась перед первой ТЛА и после серии ТЛА. Изучение структуры легочной артерии проводилось только на первой ветви, подвергшейся ТЛА.

У всех пациентов проводился сбор анамнеза для уточнения давности перенесенной ТЭЛА, оценивалось функциональное состояние (дистанция в Т6МХ, уровень мозгового натрийуретического пептида (BNP), ФК в соответствии с классификацией ВОЗ).

Всем пациентам, включенным в исследование, выполнялась КПОС согласно принятому стандартному протоколу. С использованием четырехканального катетера Свана-Ганца длиной 110 см диаметром 6F (Swan-Gantz CCO CEDV, Edwards Lifescience, Irvine, CA, США) путем прямой манометрии последовательно измерялись гемодинамические параметры малого

Таблица 2. Исходные структурные параметры легочных артерий по данным ВСУЗИ

Table 2. Baseline structural parameters of pulmonary arteries according to IVUS data

Дпром нар, мм	2,1 (1,9;2,3)
Ддист нар, мм	3,9 (2,9;5,0)
Дсред нар, мм	4,9 (4,05;5,75)
Дпром вн, мм	1,8 (1,65;1,8)
Ддист вн, мм	2,58 (2,25;2,75)
Дсред вн, мм	3,33 (2,95;4,3)

Примечание: Дпром нар – наружный диаметр ветви легочной артерии в промежуточном отделе по данным ВСУЗИ; Дпром вн – внутренний диаметр ветви легочной артерии в промежуточном отделе по данным ВСУЗИ; Ддист нар – наружный диаметр ветви легочной артерии в дистальном отделе по данным ВСУЗИ; Ддист вн – внутренний диаметр ветви легочной артерии в дистальном отделе по данным ВСУЗИ; Дсред нар – наружный диаметр ветви легочной артерии в среднем отделе по данным ВСУЗИ; Дсред вн – внутренний диаметр ветви легочной артерии в среднем отделе по данным ВСУЗИ.

Note: Dint ex – the outer diameter of the branch of pulmonary artery in the intermediate section according to IVUS data; Dint in – inner diameter of the branch of pulmonary artery in the intermediate section according to IVUS data; Ddist ex – outer diameter of the branch of pulmonary artery in the distal section according to IVUS data; Ddist in – inner diameter of the branch of pulmonary artery in the distal section according to IVUS data; Dmid ex – outer diameter of the branch of pulmonary artery in the middle section according to IVUS data; Dmid in – inner diameter of the branch of pulmonary artery in the middle section according to IVUS data.

круга кровообращения. Сатурация смешанной венозной крови измерялась на портативном анализаторе i-STAT1 Analyzer (Abbott, США), сатурации артериальной крови – с помощью пульсоксиметра на пальце руки. Вычисление СВ проводилось с помощью непрямого метода Фика. Из полученных данных также рассчитывалось ЛСС.

Для уточнения характера поражения легочных артерий и определения целей для ТЛА, измерения диаметра легочных артерий выполнялась обзорная и селективная ангиопульмонография. По диагностическому проводнику Amplatz Type Super Stiff J-Tip (Boston Scientific, США) диаметром 0,035 дюйма длиной 260 см в правую или левую легочную артерию доставлялся диагностический катетер диаметром 6 F длиной 110 см Pigtail 145 (Cordis, США), затем проводилась съемка в прямой и боковой проекции в режиме цифровой субтракции. Селективная съемка целевой ветви легочной артерии проводилась непосредственно перед ТЛА с помощью направляющего катетера. Все измерения выполнялись на программном обеспечении RadiAnt DICOM Viewer 2020.1.1. на кадре с максимальным заполнением артерии контрастным препаратом. Для калибровки использовался кончик направляющего катетера. Измерялся диаметр просвета сосуда в проксимальном (Dпрокс), среднем (Dсред) и дистальном (Dдист) отделах – на уровне ветвей легочной артерии 3-го, 4-го и 5-го порядка, т.е. сегментарных, субсегментарных артерий и ветвей субсегментарных артерий. Выбор идентичных точек при повторном измерении осуществлялся с помощью анатомических ориентиров (особенностей хода артерии, отхождения ветвей). Также определялся расчетный показатель – индекс ремоделирования (ИР), соответствующий относительному изменению диаметра артерии при контрольном обследовании после серии ТЛА по сравнению с диаметром сразу после ТЛА.

Для выполнения ВСУЗИ в дистальный отдел выбранной ветви легочной артерии устанавливался интракоронарный проводник, по нему проводился электронный ВСУЗИ-катетер Eagle

Рисунок 2. Изменение диаметра ветви легочной артерии по данным ангиографии

Figure 2. Changes of the diameter of pulmonary artery branch according to angiography

Примечание: ТЛА – транслюминальная баллонная ангиопластика легочных артерий; Dдист – диаметр ветви легочной артерии в дистальном отделе по данным ангиопульмонографии; Dсред – диаметр ветви легочной артерии в среднем отделе по данным ангиопульмонографии; Dпрокс – диаметр ветви легочной артерии в проксимальном отделе по данным ангиопульмонографии.

Note: BPA – balloon pulmonary angioplasty; Ddist – diameter of the branch of pulmonary artery in the distal section according to angiopulmonography; Dmid – diameter of the branch of pulmonary artery in the middle section according to angiopulmonography; Dprox – diameter of the branch of pulmonary artery in the proximal section according to angiopulmonography.

Рисунок 1. Сравнение клинических и гемодинамических параметров до и после ТЛА

Figure 1. Comparison of clinical and hemodynamic parameters before and after BPA

Примечание: ТЛА – транслюминальная баллонная ангиопластика легочных артерий; ФК – функциональный класс по классификации Всемирной Организации Здравоохранения; Т6МХ – тест 6-минутной ходьбы; BNP – мозговой натрийуретический пептид; срДЛА – среднее давление в легочной артерии; ЛСС – легочное сосудистое сопротивление.

Note: BPA – balloon pulmonary angioplasty; FC – functional class according to the classification of the World Health Organization; 6MWT – 6-minute walking test; BNP – brain natriuretic peptide; mPAP – mean pulmonary artery pressure; PVR – pulmonary vascular resistance.

Eye® Platinum (Volcano Therapeutics, Inc., США) с 64-мя пьезо-элементами, частотой 20 МГц (рис. 1). Измерения проводились на среднем (сред), дистальном (дист) и промежуточном (пром) уровне – ветви легочной артерии 4-го, 5-го и 6-го порядка, то есть субсегментарные легочные артерии и их ветви. При достижении ВСУЗИ-катетером дистального отдела выбранной ветви выполнялась обратная тракция в ручном режиме длиной 60-80 мм. Данные записи с датчика обрабатывались на консоли Volcano S5 (Volcano Therapeutics, Inc., США). Для измерения необходимых параметров были использованы поперечные серошальные изображения. Выбор одних и тех же участков артерии при оценке параметров в динамике проводился, как и при ангиографии, по анатомическим ориентирам. Измерялись следующие параметры: диаметр сосуда, ограниченный наружной эластической мембраной (Dнар); диаметр просвета сосуда, ограниченный интимой сосуда (Dвн); минимальная, максимальная и средняя толщина стенки сосуда, соответствующая толщине комплекса интима-медиа (Tmin, Tmax, Tmean); площадь просвета сосуда, ограниченная интимой (LA); площадь стенки сосуда, соответствующая площади, занимаемой комплексом интима-медиа (Sct); площадь, ограниченная наружной эластической мембраной (EEM); относительная толщина стенки сосуда (RWT) – $Tmean / Dвн$; относительная площадь, занимаемая стенкой сосуда (%Sct) – Sct / EEM ; индекс ремо-

делирования по данным ВСУЗИ (ИР ВСУЗИ) – относительное изменение диаметра артерии при контрольном обследовании после серии ТЛА по сравнению с диаметром сразу после ТЛА по данным ВСУЗИ.

Для выполнения ТЛА использовался аппарат Allura Xper FD-10 (Philips, Нидерланды). По направляющему катетеру JR 4 или МРА 1 через пораженный участок проводился интракоронарный проводник. С помощью проводника доставлялись и позиционировались баллоны диаметром от 2 до 6 мм для поэтапной дилатации пораженного участка. Подходящий размер баллона определялся по данным количественной ангиографии и ВСУЗИ. Для снижения риска реперфузионного отека вмешательство выполнялось с учетом значения индекса PEPSI (Pulmonary Edema Predictive Scoring Index), а после ТЛА всем пациентам проводилась активная диуретическая терапия фуросемидом и неинвазивная вентиляция легких в режиме Continuous positive airway pressure (CPAP) в течение нескольких часов.

Статистический анализ

Статистический анализ данных проводился при помощи программы STATISTICA 12,5 (StatSoft, Россия). Данные описательной статистики представлены в виде: медианы, 25% и 75% квартилей – Me (Q1;Q3); среднего значения и стандартного отклонения – $M \pm s$. При сравнении показателей двух зависимых групп был применен непараметрический тест Вилкоксона, при

Рисунок 3. Динамика параметров ветви легочной артерии, подвергшейся ТЛА, в среднем отделе
Figure 3. Dynamics of the parameters of pulmonary artery branch undergone BPA in the middle section

Примечание: ТЛА – транслюминальная баллонная ангиопластика легочных артерий; Dнар – диаметр сосуда, ограниченный наружной эластической мембраной; Dвн – диаметр просвета сосуда, ограниченный интимой сосуда; Tmin, Tmax, Tmean – минимальная, максимальная и средняя толщина стенки сосуда, соответствующая толщине комплекса интима-медиа; LA – площадь просвета сосуда, ограниченная интимой; Sct – площадь стенки сосуда, соответствующая площади, занимаемой комплексом интима-медиа; EEM – площадь, ограниченная наружной эластической мембраной; RWT – относительная толщина стенки сосуда, $Tmean / Dвн$; %Sct – относительная площадь, занимаемая стенкой сосуда, Sct / EEM .

Note: BPA – balloon pulmonary angioplasty; Dex – the diameter of the vessel, limited by the external elastic membrane; Din – diameter of the vessel lumen, limited by the intima of the vessel; Tmin / Tmax / Tmean – maximum / minimum / mean vessel wall thickness corresponding to the thickness of the intima-media complex; LA – the lumen area of the vessel, limited by the intima; S – the area of the vessel wall corresponding to the area, occupied by the intima-media complex; EEM – the area, bounded by the external elastic membrane; RWT – relative vessel wall thickness, $Tmean / Din$; %S – the relative area, occupied by the vessel wall, S / EEM .

сравнении двух независимых групп – непараметрический тест Манна-Уитни. Оценка корреляционных связей проводилась при помощи непараметрического теста Спирмена. Статистически достоверными признавались различия при уровне значимости меньше 5% ($p < 0,05$).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Включенному в исследование 21 пациенту было выполнено 50 процедур ТЛА – серии из $2,3 \pm 1,5$ этапов ТЛА на одного пациента. Интервал между вмешательствами составил 4-8 недель. Клинически значимых осложнений вмешательства отмечено не было. Срок наблюдения составил 165 (88;248) дней с первой ТЛА, 72 (36;110) дней после последней ТЛА серии.

После серии ТЛА было выявлено статистически достоверное увеличение дистанции в Т6МХ ($p=0,003$). Также была отмечена положительная динамика других наблюдавшихся клинических и гемодинамических параметров (рис. 1). Значение СВ осталось на прежнем уровне – 3,85 л/мин исходно и 3,7 л/мин после серии ТЛА ($p=0,850$).

При анализе изменения размера артерий, подвергшихся ангиопластике, по данным ангиографии, были получены следующие данные: в проксимальном, среднем и дистальном отделах сразу после ТЛА наблюдалось статистически достоверное увеличение диаметра артерий ($p<0,05$); при сравнении диаметра

артерий исходно и при контрольном визите – также увеличение диаметра в проксимальном ($p=0,062$), среднем ($p=0,110$) и дистальном ($p=0,017$) отделах; тенденция к изменению размера артерии при контрольном визите после серии ТЛА по сравнению с состоянием сразу после ТЛА была наиболее выражена определялась только в проксимальном ($p=0,333$) и дистальном ($p=0,286$) отделах (рис. 2). Индекс ремоделирования для проксимального отдела составил 11,9%, среднего – 3,5%, дистального – 4,7%.

При сравнении результатов ВСУЗИ в среднем отделе исходно и после ТЛА наблюдалось увеличение наружного (Днар) и внутреннего (Двн) диаметра сосуда ($p=0,074$ и $0,093$), площади просвета сосуда (LA) ($p=0,093$), площади, ограниченной наружной эластической мембраной (ЕЕМ) ($p=0,047$), небольшое увеличение площади стенки сосуда (Sct) ($p=0,169$) при уменьшении относительной площади стенки сосуда (Sct%) ($p=0,241$). Анализ результатов исходно и после серии ТЛА выявил следующие изменения: увеличение Днар и Двн ($p=0,062$ и $p=0,076$), LA ($p=0,074$), уменьшение Tmean ($p=0,225$), Sct% ($p=0,138$). При сравнении состояния ветви легочной артерии по данным ВСУЗИ сразу после ТЛА и при контроле после серии ТЛА: уменьшение Sct% ($p=0,103$). Четкой динамики других показателей ВСУЗИ зафиксировано не было (рис. 3).

Рисунок 4. Динамика параметров ветви легочной артерии, подвергшейся ТЛА, в дистальном отделе
Figure 4. Dynamics of the parameters of pulmonary artery branch undergone BPA in the distal section

Примечание: ТЛА – транслюминальная баллонная ангиопластика легочных артерий; Днар – диаметр сосуда, ограниченный наружной эластической мембраной; Двн – диаметр просвета сосуда, ограниченный интимой сосуда; Tmin / Tmax / Tmean – минимальная, максимальная и средняя толщина стенки сосуда, соответствующая толщине комплекса интима-медиа; LA – площадь просвета сосуда, ограниченная интимой; Sct – площадь стенки сосуда, соответствующая площади, занимаемой комплексом интима-медиа; EEM – площадь, ограниченная наружной эластической мембраной; RWT – относительная толщина стенки сосуда, Tmean / Двн; Sct% – относительная площадь, занимаемая стенкой сосуда, Sct / EEM.

Note: BPA – balloon pulmonary angioplasty; Dex – the diameter of the vessel, limited by the external elastic membrane; Din – diameter of the vessel lumen, limited by the intima of the vessel; Tmin / Tmax / Tmean – maximum / minimum / mean vessel wall thickness corresponding to the thickness of the intima-media complex; LA – the lumen area of the vessel, limited by the intima; S – the area of the vessel wall corresponding to the area, occupied by the intima-media complex; EEM – the area, bounded by the external elastic membrane; RWT – relative vessel wall thickness, Tmean / Din; %S – the relative area, occupied by the vessel wall, S / EEM.

При попарном анализе данных ВСУЗИ в дистальном отделе были получены следующие результаты: сравнение показателей исходно и сразу после ТЛА – увеличение Днар и Двн ($p=0,005$ и $0,028$), LA ($p=0,028$), EEM ($p=0,005$), уменьшение RWT ($p=0,139$) и Sct% ($p=0,074$); исходно и после серии ТЛА – увеличение Днар и Двн ($p=0,023$ и $0,025$), LA ($p=0,025$), EEM ($p=0,107$), уменьшение Tmean ($p=0,198$), RWT ($p=0,098$), Sct ($p=0,225$), Sct% ($p=0,061$); сразу после ТЛА и при контрольном обследовании после серии ТЛА – уменьшение максимальной толщины стенки (Tmax) ($p=0,068$), Tmean ($p=0,043$), RWT ($p=0,138$), Sct ($p=0,043$), Sct% ($p=0,138$) (рис. 4).

При оценке 3 серий результатов показателей ВСУЗИ в промежуточном отделе наблюдались следующие закономерности: при сравнении исходно и сразу после ТЛА – увеличение Днар и Двн ($p=0,008$ и $0,011$), Tmax ($p=0,091$), Tmean ($p=0,051$), LA ($p=0,008$), Sct ($p=0,011$), EEM ($p=0,012$), Sct% ($0,314$); исходно и после серии ТЛА – увеличение Днар и Двн ($p=0,006$ и $0,010$), LA ($p=0,006$), EEM ($p=0,010$); сразу после ТЛА и при контрольном обследовании после серии ТЛА – увеличение Днар и Двн

($p=0,097$ и $0,086$), LA ($p=0,097$), уменьшение RWT ($p=0,138$), Sct ($p=0,043$), Sct% ($p=0,138$) (рис. 5).

Индексы ремоделирования легочной артерии по данным ВСУЗИ (ИР ВСУЗИ) составили: в среднем отделе – 9%, в дистальном отделе – 15%, в промежуточном отделе – 11%.

В настоящем исследовании также был проведен анализ ранговой корреляции Спирмена для определения взаимосвязи клинических и гемодинамических параметров со структурными характеристиками легочных артерий, полученными с помощью ангиографии. Были выявлены умеренные и сильные связи между следующими показателями: срДЛА после серии ТЛА и диаметром ветви легочной артерии (D ЛА) в дистальном отделе после серии ТЛА ($r=-0,74$, $p=0,006$); СВ после серии ТЛА и D ЛА в дистальном отделе после серии ТЛА ($r=0,71$, $p=0,010$); ЛСС после серии ТЛА и D ЛА в дистальном отделе после серии ТЛА ($r=-0,78$, $p=0,003$). Также отмечена корреляция между сроком наблюдения и ИР в проксимальном отделе ($r=0,71$, $p=0,015$). Статистический анализ корреляции с данными ВСУЗИ не выполнялся в связи с малой выборкой пациентов.

Рисунок 5. Динамика параметров ветви легочной артерии, подвергшей ТЛА, в промежуточном отделе
Figure 5. Dynamics of the parameters of pulmonary artery branch undergone BPA in the intermediate section

Примечание: ТЛА – транслюминальная баллонная ангиопластика легочных артерий; Днар – диаметр сосуда, ограниченный наружной эластической мембраной; Двн – диаметр просвета сосуда, ограниченный интимой сосуда; Tmin, Tmax, Tmean – минимальная, максимальная и средняя толщина стенки сосуда, соответствующая толщине комплекса интима-медиа; LA – площадь просвета сосуда, ограниченная интимой; Sct – площадь стенки сосуда, соответствующая площади, занимаемой комплексом интима-медиа; EEM – площадь, ограниченная наружной эластической мембраной; RWT – относительная толщина стенки сосуда, Tmean / Двн; Sct% – относительная площадь, занимаемая стенкой сосуда, Sct / EEM.

Note: BPA – balloon pulmonary angioplasty; Dex – the diameter of the vessel, limited by the external elastic membrane; Din – diameter of the vessel lumen, limited by the intima of the vessel; Tmin / Tmax / Tmean – maximum / minimum / mean vessel wall thickness corresponding to the thickness of the intima-media complex; LA – the lumen area of the vessel, limited by the intima; S – the area of the vessel wall corresponding to the area, occupied by the intima-media complex; EEM – the area, bounded by the external elastic membrane; RWT – relative vessel wall thickness, Tmean / Din; %S – the relative area, occupied by the vessel wall, S / EEM.

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящем исследовании количество выполненных ТЛА на одного пациента было ниже рекомендуемого рядом авторов для достижения целевого срдЛА [9,10]. Однако, достигнутая по нескольким клиническим и гемодинамическим параметрам положительная динамика позволяет говорить об уже развившемся эффекте ТЛА и предполагать наличие определенных структурных изменений в легочных артериях.

По данным ангиографии непосредственно после ТЛА происходит достоверное увеличение диаметра легочной артерии во всех исследуемых отделах – проксимальном, среднем и дистальном, что обусловлено непосредственным механическим воздействием во время ангиопластики и резким повышением давления ветви легочной артерии (в области с плохой перфузией до ТЛА). Продолжение изменения размеров легочной артерии в периоде наблюдения («положительное ремоделирование») может быть обусловлено непосредственно структурными изменениями ее стенки. Наибольший индекс ремоделирования наблюдался в проксимальном и дистальном отделе (т.е. на уровне сегментарных артерий и ветвей субсегментарных артерий), что позволяет предположить наличие структурных изменений у пациентов с ХТЭЛГ и на этом уровне – помимо уровня микроциркуляторного русла с диаметром сосудов менее 500 мкм [4]. Для уточнения конкретных патоморфологических особенностей ветвей субсегментарных артерий может быть целесообразным проведение дополнительных гистологических исследований.

При проведении ВСУЗИ сразу после ТЛА у большинства пациентов наблюдалось увеличение абсолютной площади сосудистой стенки. Такие изменения, возникающие после баллонирования ветви легочной артерии и восстановления кровотока по ней, вероятно, следует рассматривать как явления локального отека сосудистой стенки на фоне механического повреждения эндотелия. В большей степени увеличение площади стенки наблюдалось в проксимальном отделе – область раздувания баллона и растяжения эндотелия, и в дистальном отделе – область воздействия высокого давления крови после резкого увеличения перфузии данного участка.

Также при ВСУЗИ во всех отделах отмечалось увеличение просвета, диаметра сосуда, уменьшение толщины и площади стенки сосуда сразу после ТЛА, а в дистальном и промежуточном отделах – также и в периоде наблюдения после серии ТЛА. При этом самая большая динамика изучаемых показателей была зафиксирована на уровне более мелких артерий (дистальном и промежуточном), что подтверждается расчетным показателем – индексом ремоделирования по ВСУЗИ. Полученные результаты согласуются с данными ангиографии и подтверждают наличие положительного ремоделирования легочных артерий на указанном уровне (ветви субсегментарных артерий 1-го и 2-го порядка). Пролонгированный эффект дилатации сосудов после ангиопластики также может быть рассмотрен и как негативный: при отсутствии в литературе в настоящее время данных гистологических исследований легочных артерий после ТЛА нельзя полностью исключить продолжение увеличения размера сосуда в периоде наблюдения в результате повреждающего действия высокого давления в легочной артерии. Однако клинические данные свидетельствуют о дополнительном позитивном эффекте на функциональное состояние пациентов положительного ремоделирования легочных артерий после ТЛА. Также при оценке корреляционных связей была продемонстрирована умеренная и сильная корреляция гемодинамических параметров (среднего давления в легочной артерии, сердечного выброса, легочного сосудистого

сопротивления) и диаметра легочной артерии в дистальном отделе по данным ангиографии. Кроме того, была выявлена положительная связь между сроком наблюдения пациента после первой ТЛА и индексом ремоделирования в проксимальном отделе, что подтверждает пролонгированный эффект от ТЛА и требует дальнейшего изучения.

Заключение

Транслуминальная баллонная ангиопластика легочных артерий у неоперабельных пациентов с хронической тромбоэмболической легочной гипертензией приводит к стойкому увеличению просвета баллонированных сосудов. В отдаленном периоде происходит положительное ремоделирование легочных артерий с наибольшим эффектом дистальнее уровня субсегментарных артерий. Диаметр сосудов на этом уровне имеет выраженную корреляционную связь с гемодинамическим результатом ангиопластики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Чазова И.Е., Мартынюк Т.В. Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической тромбоэмболической легочной гипертензии (I часть). *Терапевтический архив*. 2016;88(9):90-101. [Chazova I.E., Martynyuk T.V. Clinical guidelines for the diagnosis and treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension (Part 1). *Terapevticheskii arkhiv*. 2016;88(9):90-101 (in Russ.)] DOI: 10.17116/terarkh201688990-101
2. Galie N., Humbert M., Vachiery J. et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. *Eur Heart J*. 2015;37(1):67-119. DOI: 10.1093/eurheartj/ehv317
3. Чазова И.Е., Мартынюк Т.В., Валиева З.С. и соавт. Евразийские клинические рекомендации по диагностике и лечению легочной гипертензии. *Евразийский кардиологический журнал*. 2020; (1): 78-122. [Chazova I.E., Martynyuk T.V., Valieva Z.S. et al. Eurasian clinical guidelines on diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. *Eurasian heart journal*. 2020;(1):78-122 (in Russ.)] <https://doi.org/10.38109/2225-1685-2020-1-78-122>
4. Чазова И.Е., Мартынюк Т.В. (ред.), Авдеев С.Н. и соавт. Легочная гипертензия. М.: Практика, 2015. с. 81-102, 309-324, 563-604. [Chazova I.E., Martynyuk T.V. (ed.), Avdeev S.N. et al. *Pulmonary hypertension*. М.: Practica, 2015. P. 81-102, 309-324, 563-604 (in Russ.)]. ISBN 978-5-89816-138-5
5. D'Armini A., Morsolini M., Mattiucci G. et al. Pulmonary endarterectomy for distal chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *J Thorac Cardiovasc Surg*. 2014;148(3):1005-1012.e2. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2014.06.052
6. Madani M., Auger W., Pretorius V. et al. Pulmonary Endarterectomy: Recent Changes in a Single Institution's Experience of More Than 2,700 Patients. *Ann Am Thorac Soc*. 2012;9(4):97-103. DOI: 10.1016/j.athoracsur.2012.04.004
7. Yanaka K., Nakayama K., Shinke T. et al. Sequential Hybrid Therapy With Pulmonary Endarterectomy and Additional Balloon Pulmonary Angioplasty for Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension. *J Am Heart Assoc*. 2018;7(13). DOI: 10.1161/jaha.118.008838
8. Карабашева М.Б., Данилов Н.М., Сагайдак О.В. и соавт. Отдаленные результаты транслуминальной баллонной ангиопластики легочных артерий у пациентов с неоперабельной формой хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. *Системные гипертензии*. 2019; 16(4): 27-32. [Karabasheva M.B., Danilov N.M., Sagaidak O.V. et al. Long-term outcomes after percutaneous transluminal pulmonary angioplasty for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Systemic Hypertension*. 2019;16(4):27-32 (in Russ.)] DOI: 10.26442/2075082x.2019.4.190609
9. Данилов Н.М., Матчин Ю.Г., Чазова И.Е. Баллонная ангиопластика легочных артерий при неоперабельной хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. *Consilium Medicum*. 2016; 18 (5): 59-61. [Danilov N.M., Matchin Y.G., Chazova I.E. Balloon pulmonary angioplasty for inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Consilium Medicum*. 2016;18(5):59-61 (in Russ.)] DOI: 10.26442/2075-1753_2016.5.59-61
10. Lang I., Meyer B., Ogo T. et al. Balloon pulmonary angioplasty in chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Eur Respir Rev* 2017; 26: 160119. DOI: 10.1183/16000617.5119-2016